

ポリオの予防接種に関するお知らせ

～9月1日から接種の方法が次のとおり変わります～

	平成 24 年9月1日から	参考(これまで)
使用するワクチン	不活化ワクチン	生ワクチン
接種方法	皮下に注射	経口接種（口から飲む）
接種をおすすめする年齢（標準の接種年齢）と接種方法	初回接種（3回） 生後3か月～12か月の間に 20日～56日の間隔で3回 追加接種（1回） 初回接種終了後、 12か月～18か月の間に1回	生後3か月～18か月の間に 41日以上の間隔をあけて2回
対象年齢 (無料で受けられる年齢)	生後3か月～90か月（7歳6か月）未満	
接種場所	市内の協力医療機関（約870か所）	各区 福祉保健センター
実施期間	通年	春・秋の年2回

※最新情報↓横浜市保健所ホームページ（横浜市保健所 予防接種 で検索）に掲載します。
<http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/kansensyo/vaccination.html>

※追加接種について

9月1日の導入時点では4回目の追加接種は定期接種対象外（公費対象外）です。
（現在、国内臨床試験を実施中のため、データが整い次第導入予定）

※市内の協力医療機関

8月上旬ごろ、上記ホームページに掲載する予定です。

※予防接種の予診票（接種券）

9月からの開始にあわせて協力医療機関に置く予定です。

9月1日の不活化ポリオワクチン導入前に
1回目の生ポリオワクチンを接種したお子さんは、
2回目以降は不活化ポリオワクチンを
受けることとなります。


- ◆生ポリオワクチンを1回接種したお子さんは、平成24年9月以降に不活化ポリオワクチンを3回接種することとなります。
- ◆生ポリオワクチンを既に2回接種されたお子さんは、不活化ポリオワクチンの接種は不要です。
【裏面の接種パターンを参照】

お問い合わせ 横浜市ワクチン相談窓口

☎045-671-4183 午前9時～午後5時（土日・祝日、年末年始除く）

どうすればいいの？ポリオワクチン

～ お子さんの接種歴に応じた不活化ポリオワクチンの接種方法 ～



※平成24年9月1日の導入時点では4回目の追加接種は定期接種対象外(公費対象外)です。(現在国内臨床試験を実施中のため、データが整い次第導入予定)

接種スケジュールについては、医師とご相談ください。